

POPIS ODRŮDY
VARIETY DESCRIPTION

- | | |
|--|---|
| 1. Číslo odrůdy: Reference number of reporting authority: | TTA21117 |
| 2. Číslo odrůdy žadající instituce: Reference number of requesting authority: | 72/2016 |
| 3. Šlechtitelské označení odrůdy: Breeder's reference: | SZD 1249 |
| 4. Žadatel (jméno, adresa): Applicant (name and address): | AS Dotnuva Baltic, Savimäe 7, Vahi, Tartu vald 60534 Tartumaa, Estonia |
| - . Udržovatel (je-li jiný než ad 4.): Maintainer (if different from ad 4.): | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Saatzuchtstrasse 11, 2301 Probstdorf, Austria |
-
- | | |
|--|---|
| 5. Druh - latinsky: Botanical name of taxon: | Triticum aestivum L. |
| 6. Druh - česky: Common name of taxon: | Pšenice setá ozimá Wheat (winter type) |
| 7. Název odrůdy: Variety denomination: | Balitus |
| 8. Datum a číslo zkušební směrnice / technického protokolu: Date and document number of Test Guideline / Technical Protocol: | 28.10.2009, CPVO-TP/3/4 rev. |
| 9. Zkušební instituce: Testing authority: | ÚKZÚZ |
| 10. Zkušební stanice: Testing station(s) and place(s): | Chrlice |
| 11. Doba zkoušení: Period of testing: | 2011–2013 |
| 12. Datum a místo vyhotovení: Date and place of issue of document: | 29.11.2018, Brno |
| 13. Zařazení odrůdy do skupin: Znaky použité pro tvorbu skupin jsou v popisu (14.) označeny písmenem G před číslem znaku. Group: If characteristics of number 14 are used for grouping, they are marked with a G in that number. | |
| 14. Znaky odrůdy podle klasifikátoru zkušebních směrnic: Characteristics included in the CPVO Technical Protocol, UPOV Test Guidelines or National Guidelines: | |

| CPVO Č. No. | UPOV Č. No. | Znak Characteristic | Stupeň projevu State of Expression | Známka Note | Poznámka Remark |
|----------------|----------------|--|---|----------------|--------------------|
| 1. | 1. | Koleoptile: antokyanové zbarvení Coleoptile: anthocyanin coloration | slabé weak | 3 | |
| 2. | 2. | Rostlina: růstový habitus Plant: growth habit | střední až polorozkladitý intermediate to semi-prostrate | 6 | |
| 3. | 4. | Rostlina: četnost rostlin s ohnutými praporcovitými listy Plant: frequency of plants with recurved flag leaves | nízká low | 3 | |
| 4. | 5. | Doba metání (první klásek viditelný u 50 % klasů) Time of ear emergence (first spikelet visible on 50% of ears) | raná až střední early to medium | 4 | |
| 5. | 6. | Praporcovitý list: ojínění listové pochvy Flag leaf: glaucosity of sheath | silné až velmi silné strong to very strong | 8 | |
| 6. | - | Praporcovitý list: ojínění čepele (spodní strana) Flag leaf: glaucosity of blade (lower side) | silné až velmi silné strong to very strong | 8 | |
| 7. | 7. | Klas: ojínění Ear: glaucosity | silné až velmi silné strong to very strong | 8 | |
| 8. | 8. | Stéblo: ojínění prvního internodia pod klasem Culm: glaucosity of neck | silné strong | 7 | |
| 9. | 9. | Rostlina: délka (stéblo, klas, osiny a osinky) Plant: length (stem, ear, awns and scurs) | střední medium | 5 | |
| G 10. | G 10. | Stéblo: dřev na příčném řezu (uprostřed mezi bází klasu a kolénkem pod klasem) Straw: pith in cross section (halfway between base of ear and stem node below) | není nebo velmi tenká absent or very thin | 1 | |
| 11. | 11. | Klas: tvar v profilu Ear: shape in profile | hranolovitý parallel sided | 2 | |
| 12. | 12. | Klas: hustota Ear: density | střední medium | 5 | |
| 13. | 13. | Klas: délka (bez osin a osinek) Ear: length (excluding awns and scurs) | střední medium | 5 | |
| G 14. | G 14. | Osiny nebo osinky: výskyt Awns or scurs: presence | osinky přítomny scurs present | 2 | |
| 15. | 15. | Osiny nebo osinky na špičce klasu: délka Awns or scurs at tip of ear: length | velmi krátká very short | 1 | |
| G 16. | G 16. | Klas: barva Ear: colour | bílá white | 1 | |
| 17. | 17. | Vrcholový článek klasového větene: vnější chloupkatost Apical rachis segment: hairiness of convex surface | slabá až střední weak to medium | 4 | |
| 18. | 18. | Pleva: šířka ramene (klásek v prostřední třetině klasu) Lower glume: shoulder width (spikelet in midthird of ear) | střední až široká medium to broad | 6 | |
| 19. | 19. | Pleva: tvar ramene (jako u 18) Lower glume: shoulder shape (as for 18) | rovný straight | 5 | |
| 20. | 20. | Pleva: délka zubu (jako u 18) Lower glume: beak length (as for 18) | velmi krátká až krátká very short to short | 2 | |

| CPVO Č. No. | UPOV Č. No. | Znak Characteristic | Stupeň projevu State of Expression | Známka Note | Poznámka Remark |
|----------------|----------------|---|---------------------------------------|----------------|--------------------|
| 21. | 21. | Pleva: tvar zubu (jako u 18) Lower glume: beak shape (as for 18) | slabě ohnutý slightly curved | 3 | |
| 22. | 22. | Pleva: rozsah vnitřní chloupkatosti (jako u 18) Lower glume: extent of internal hair (as for 18) | slabý weak | 3 | |
| 23. | 24. | Zrno: barva Grain: colour | červená red | 2 | |
| 24. | 25. | Zrno: zbarvení fenolem Grain: coloration with phenol | střední až tmavé medium to dark | 6 | |
| G 25. | G 26. | Vývojový typ Seasonal type | ozimý winter type | 1 | |

15. Podobné odrůdy a odlišnosti od těchto odrůd:

Similar varieties and differences from these varieties:

| Název podobné odrůdy Denomination of similar variety | Znak, ve kterém se podobná odrůda odlišuje Characteristic in which the similar variety is different | Stupeň projevu znaku podobné odrůdy State of expression of similar variety | Stupeň projevu znaku zkoušené odrůdy State of expression of candidate variety | |
|---|--|---|--|---|
| KT Hasáb | 2./2. Rostlina: růstový habitus Plant: growth habit | polovzpřímený až střední emi-erect to intermediate | 4 střední až polorozkladitý intermediate to semi-prostrate | 6 |
| | 11./11. Klas: tvar v profilu Ear: shape in profile | polokyjovitý semi-clavate | 3 hranolovitý parallel sided | 2 |

16. Další informace: -

Additional Information:

a) Další údaje:

Additional Data:

b) Poznámky:

Notes: