


'29-03'

Vaccinium ×atlanticum E.P. Bicknell (sün. *Vaccinium angustifolium* Aiton × *Vaccinium corymbosum* L.), poolkõrge mustikas (ahtalehine mustikas × kännasmustikas).

Sordikirjeldus

1. Taime kasvutugevus - keskmine.
2. Taimede kasvulaad - püstine.
3. Üheaastase võrse värv – punakasroheline.
4. Üheaastase võrse pungade vahe (ülemine osa) – keskmine kuni pikk
7. Lehe tüüp- ovaalse kujuga lihtleht.
8. Lehe pikkus- 7,0 cm; laius – 3,0 cm; pikkuse ja laiuse suhe – 2,3.
9. Lehe ülemise poole rohelise värvuse intensiivsus- keskmine.
10. Leheserv - sakiline
9. Vilja kuju- lapikümar
10. Vilja suurus- keskmine.
11. Vilja värvus- tumesinine, keskmise vahakirmega.
12. Vilja valmimisaeg- keskvalmiv.
13. Muud sordile iseloomulikud tunnused

Taime kõrgus keskmiselt 90 cm, põõsa läbimõõt 100 cm. Taimed on hea talvekindlusega. Õis on kupja kujuga ning valget värvi. Õisik on lühike ja keskmise tihedusega. Taimed õitsevad mai lõpus juuli alguses. Õitsemisest viljade valmimiseni kulub ca 60 päeva. Vilja mass on 1,8 g, saagikus 1,0 kg taim. Viljades on tiitritavaid happeid 1,3%, rakumahla kuivaine sisaldus on keskmiselt 14%, askorbiinhappe (vitamiin C) sisaldus 11 mg/100g, fenoolsete ühendite üldsisaldus 235 mg/100g ja antotsüaanide sisaldus 150 mg/100g.



Joonis 1. Poolkõrge mustikas '29-03' viljad (Foto: M. Starast)