

Perekond õunapuu (*Malus Mill.*)

Liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica L.*)

Sordi nimi: 'Kaneelõun' (sünonüümid 'Коричное полосатое', 'Коричное', 'Cinnamon Pipe', 'Koritchnoie', 'Koritchnevoie', 'Jooneline kaneelõun')

1.1 puu kasvutugevus: tugev

1.2 puu kasvulaad (võra kuju): noorelt laipüramidaalne; hiljem ümmargune, rippuvate okstega

1.3 võrsete koore värvus: tumepruun

1.4 võrsel lõvede kuju: ümar

1.5 kasvupungade kuju ja asetus: lai/ümar; liibuv

1.6 lehelaba kuju: elliptiline või piklik-elliptiline, pika terava tipuga. Lehelaba lame, mõnikord piki keskroodu esilekerkiv (küürus), karvadega kaetud

1.7 leheserv: täkilissaagjas või täkiline

1.8 vilja kuju: lameümmargune, ilma kantideta

1.9 vilja kesta kattevärvus: tähnilisel foonil tumepunased tugevad jooned

1.10 vilja põhivärvus: valminult rohekaskollane, järelvalminult kollane

1.11 tarbimisaeg: sügissort - valmib septembrikuu esimesel dekaadil ja säilib novembrini

1.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: õitsemise algusaeg (10% õitest avanenud): eriti varajane – varajane (arvestatud 6 aasta vaatlusandmete põhjal, võrdlussordiks 'Valge klaarõun' – keskmine päevade erinevus 4 päeva), alustab õitsemist pisut varem kui 'Valge klaarõun', võrsed kaetud hõredalt karvadega

Märkus: sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus:

„Eesti Pomoloogia“. Tallinn: Valgus, 1970. Lk 72.

Vaatluste andmed

Koostanud K.Volens