

# KARANTIINNE TAIMEKAHJUSTAJA

## *Cowpea mild mottle virus*

### Taimkahjustaja lühikirjeldus

*Cowpea mild mottle virus* on taimeviirus, mis kahjustab spargelubasid, sojaubasid, maapähkleid, aga samuti tomateid. Taimeviirust levitab lehtede alaküljel toituv karantiinne karilane *Bemisia tabaci*, viirus levib ka mitmete taimede seemnetega või vigastuste kaudu. Viirus on levinud igal mandril.



*Cowpea mild mottle virus* põhjustatud lehtede nekrootilised sojaal  
Foto: L.G. Zanardo, Brasiilia



Viiruse poolt kahjustunud mosaiikne ja klorootiline sojaal leht  
Foto: L.G. Zanardo, Brasiilia

### Kahjustustunnused

Viiruse sümptomid võivad olenevalt peremeestaimest ja kasvuhooajast erineda. Soja- ja aedoal tekib lehe-roodude mosaiiksus ning lehtede kloroos, millele järel lehtede kasv seiskub, lehed jäävad kängu ning kuivavad alates leheetstest. Tomatitel põhjustab viirus lehesoontele laigulisi ja triibulisi mustreid.

### Peremeestaimed

Viiruse peremeestaimedeks on maapähklid, limauba, aeduba, goa-tiibuba, sojauba, põlduba, tomat, munguba, lehmahernes, baklažaan ning mitmed liblikõielised umbrohud.

### Levik

Taimkahjustaja kauglevik on võimalik saastunud peremeestaimede ja seemnete rahvusvahelisel kaubavahetusel. Viiruse lähilevik võib toimuda mehaaniliselt või teda siirutava karantiinse karilase *B. tabaci* abil.

Lisainfo: EPPO Global Database - [taimekahjustaja iseloomustus ja levikuala](#)

\* EPPO – Euroopa ja Vahemeremaade taimekaitseorganisatsioon